

تعریف:

ختنه عمل جراحی برداشتن پرپوس است. پرپوس پوستی است که قسمت انتهایی آلت تناسلی را می پوشاند.

دلایل ختنه کردن:

به طور طبیعی در زیر پوستی که آلت تناسلی کودک را می پوشاند، به طور دائم ماده سفیدرنگی ترشح می شود که البته این ماده عفونی نمی باشد و خاصیت نرم کنندگی دارد و مانع چسبیدن پوست به سر آلت می گردد. در بعضی از این مواقع این ترشحات عفونی شده و پوست سر آلت دچار عفونت می گردد. در موارد نادر عفونت مزبور در نوزادان و شیرخواران موجب عفونت ادراری می شود.

۱

آمار نشان داده است که عفونت ادراری در پسر

بچه هایی که ختنه نشده اند، به مراتب بیشتر از پسر های ختنه شده است. بنابراین در مواردی ختنه می تواند از پیدایش عفونت دستگاه ادراری جلوگیری نماید.

مراقبت های بعد از ختنه:

* کودک را حداقل به مدت یک هفته یا تا زمانی که پوست بهبود می یابد، در وان قرار ندهید.
* محل را با آب خالی بشوئید. این کار را به آرامی انجام دهید چون دردناک می باشد.
* تا زمانی که آلت کودک بهبود نیافته، از به کار بردن صابون، لوسیون، پودر و دستمال مرطوب خودداری نمایید.
* در طی ۳ تا ۴ روز اول بعد از ختنه، معمولاً پزشک برای شما پماد تجویز می نماید که روی آلت بمالید.

۲

این کار را به آرامی انجام دهید چون ممکن است دردناک باشد.

* در هر بار تعویض پوشک بچه، می توانید روی پوشک در قسمتی که مجاورت آلت قرار می گیرد پماد بمالید.

* اگر خونریزی زیادی رخ داد، به پزشک مراجعه نمایید.

بهداشت را رعایت نمایید.



۳



مراقبت های بعد از ختنه

گروه هدف: بیماران محترم

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت بیمارستان شهید

مطهری

خرداد ۱۴۰۱

همدان - پل پیشاهنگی

تلفن: ۴-۳۸۲۲۴۰۰۳

کد سند: MHE.CW.56

ویرایش: B

بازنگری: خرداد ۱۴۰۱

* تغییر رنگ سر آلت به رنگ آبی یا سیاه

* درجه حرارت کودک بیش از ۳۷/۸ درجه

سانتیگراد باشد.

* ظاهر ناخوش کودک

* بوی نامطبوع یا ترشح زرد رنگ از سر آلت

* هر گونه تورم یا قرمزی در اطراف نوک آلت که پس

از ۳ روز بدتر شود.

* در صورتی که ختنه در دوران نوزادی انجام شده

است

والدین عزیز باید توجه داشته باشند که احتمال

ضعیف شدن جریان ادرار در طی ۲ ساعت اول به

علت تنگی نوک

مجرای ادرار وجود دارد.

نکته مهم و قابل توجه:

کودک شما باید تا حداکثر تا ۶ ساعت پس از ختنه،

ادرار نماید در غیر اینصورت پزشک را مطلع نمایید.



آموزش و ارتقای سلامت :

در صورتی که هر کدام از موارد ذیل اتفاق افتاد

با پزشک تماس بگیرید:

* افزایش خونریزی یا ترشح از آلت کودک